

Сокращённая информация по медицинскому применению препарата.

Наименование лекарственного средства: Кальций-Д₃ Никомед Форте. **Рег. номер** П N013355/01 от 19.09.2011. **Активные компоненты:** кальция карбонат + колекальциферол. **Лекарственная форма:** таблетки жевательные (лимонные). **Показания:** Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D₃. Дополнение к специфической терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы костей). **Способ применения и дозы:** Кальций-Д₃ Никомед Форте принимают внутрь. Таблетки можно разжевывать или рассасывать и принимать во время еды. *Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D₃.* Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день. Детям с 3 до 12 лет - по 1 таблетке в день или по назначению врача. *Дополнение к специфической терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы костей).* Взрослым - по 1 таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день. **Особые группы пациентов.** Пациенты с нарушением функции печени: коррекция дозы не требуется. Пациенты с нарушением функции почек: не следует применять Кальций-Д₃ Никомед Форте при тяжелой почечной недостаточности. Пожилые пациенты: доза такая же, как и для взрослых. Следует учитывать возможное снижение клиренса креатинина. **Противопоказания:** гиперкальциемия, гиперкальциурия, нефролитиаз, гипервитаминоз D, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к сое или арахису, тяжелая почечная недостаточность, активный туберкулез, саркоидоз. Препарат в лекарственной форме таблетки не применяется у детей в возрасте до 3-х лет. Препарат не должны принимать пациенты с фенилкетонурией. Не рекомендовано пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозо-изомальтазной недостаточностью. **Побочное действие:** нечастые: гиперкальциемия и гиперкальциурия; редко – запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, диспепсия; очень редко: зуд, сыпь, крапивница. **Особые указания:** при длительной терапии следует контролировать содержание кальция и креатинина в сыворотке крови. Наблюдение особенно важно у пациентов пожилого возраста при одновременном лечении сердечными гликозидами и диуретиками и у пациентов с повышенной склонностью к образованию камней в почках. Витамин D₃ следует принимать с осторожностью пациентам с почечной недостаточностью. В этом случае необходимо контролировать содержание кальция и фосфатов в сыворотке крови. Во избежание передозировки, необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D и кальция из других источников. Кальций и витамин D₃ должны с осторожностью применяться у иммобилизованных пациентов с остеопорозом в связи с риском развития гиперкальциемии. Одновременное применение с антибиотиками группы тетрациклина или хинолона обычно не рекомендуется, или должно осуществляться с осторожностью. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Кальций-Д₃ Никомед Форте применяют при беременности для восполнения дефицита кальция и витамина D₃ в организме. Общее суточное поступление при беременности не должно превышать 2500 мг кальция и 4000 МЕ витамина D. Гиперкальциемия на фоне передозировки в период беременности может оказать неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Кальций-Д₃ Никомед Форте применяют в период лактации. Кальций и витамин D₃ могут проникать в грудное молоко, поэтому необходимо учитывать поступление кальция и витамина D из других источников у матери и ребенка. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. **Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.** Сокращённая информация по медицинскому применению препарата.

Наименование лекарственного средства: Кальций-Д₃ Никомед. **Рег. номер** П N013478/01 от 16.09.2011. **Активные компоненты:** кальция карбонат + колекальциферол. **Лекарственная форма:** таблетки жевательные (апельсиновые, мятные, клубнично-арбузные). **Показания:** Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D₃. Дополнение к специфической терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы костей). **Способ применения и дозы:** Кальций-Д₃ Никомед принимают внутрь. Таблетки можно разжевывать или рассасывать и принимать во время еды. *Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D₃.* Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день. Детям с 5 до 12 лет - по 1-2 таблетке в день. Детям с 3 до 5 лет - дозировка в соответствии с рекомендациями врача. *Дополнение к специфической терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы костей).* Взрослым - по 1 таблетке 2-3 раза в день. **Особые группы пациентов.** Пациенты с нарушением функции печени: коррекция дозы не требуется. Пациенты с нарушением функции почек: не следует применять Кальций-Д₃ Никомед при тяжелой почечной недостаточности. Пожилые пациенты: доза такая же, как и для взрослых. Следует учитывать возможное снижение клиренса креатинина. **Противопоказания:** гиперкальциемия, гиперкальциурия, нефролитиаз, гипervитаминоз D, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к сое или арахису, тяжелая почечная недостаточность, активный туберкулез. Препарат в лекарственной форме таблетки не применяется у детей в возрасте до 3-х лет. Препарат не должны принимать пациенты с фенилкетонурией. Не рекомендовано применение препарата пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозо-изомальтазной недостаточностью. **Побочное действие:** нечастые: гиперкальциемия и гиперкальциурия; редко – запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, диспепсия; очень редко: зуд, сыпь, крапивница. **Особые указания:** при длительной терапии следует контролировать содержание кальция и креатинина в сыворотке крови. Наблюдение особенно важно у пациентов пожилого возраста при одновременном лечении сердечными гликозидами и диуретиками и у пациентов с повышенной склонностью к образованию камней в почках. Витамин D₃ следует принимать с осторожностью пациентам с почечной недостаточностью. В этом случае необходимо контролировать содержание кальция и фосфатов в сыворотке крови. Во избежание передозировки, необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D из других источников. Кальций и витамин D₃ должны с осторожностью применяться у иммобилизованных пациентов с остеопорозом в связи с риском развития гиперкальциемии. Одновременное применение с антибиотиками группы тетрациклина или хинолона обычно не рекомендуется, или должно осуществляться с осторожностью. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Кальций-Д₃ Никомед применяют при беременности для восполнения дефицита кальция и витамина D₃ в организме. Общее суточное поступление при беременности не должно превышать 2500 мг кальция и 4000 МЕ витамина D. Гиперкальциемия на фоне передозировки в период беременности может оказать неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Кальций-Д₃ Никомед применяют в период лактации. Кальций и витамин D₃ могут проникать в грудное молоко, поэтому необходимо учитывать поступление кальция и витамина D из других источников у матери и ребенка. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. **Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.**